

АМИНОМЕТИЛБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА

1. Аминометилбензойная кислота
2. Амбен, Гемостатическая губка с Амбеном, Памба
3. Средства, влияющие на кровь (Средства, влияющие на систему свертывания крови)
4. Кровоостанавливающее действие.
5. Уровень убедительности доказательств С. Контролируемых исследований не проводилось.
6. Нет данных.
7. Антифибринолитическое. Конкурентно тормозит тканевой активатор плазминогена, угнетает фибринолиз.

C_{max} создается сразу после в/в введения и сохраняется до 3 ч. Экскретируется почками (60-80%) в неизменном виде.

8. Применяется местно при спонтанных кровотечениях, кровоточивости или кровотечениях при операциях (внутриполостных, внутриторакальных, гинекологических, урологических, в т.ч. по поводу рака предстательной железы, стоматологических – после удаления миндалин, зубов).

9. Тромбоз, эмболия, нарушение функции почек, беременность.

10. Остановка наружного кровотечения.

11. Применяется местно.

DDD=0,25 г (перорально).

12. Нет.

13. Не применяется парентерально.

14. При беременности противопоказан. На период применения прекратить грудное вскармливание.

15. Развитие аллергических реакций.

16. Не известны.

17. Не применяется.

18. Четкое соблюдение рекомендаций лечащего врача, своевременное информирование о развитии возможных побочных реакций.

19. Пациент должен быть информирован о механизме действия данного препарата.

20. Раствор для инъекций 1% (ампулы); раствор для инъекций (ампулы) 1% - 5 мл; губка для местного применения (флаконы для кровезаменителей 50 мл) 1 г; таблетки 250 мг; раствор для инъекций (ампулы) 50 мг-5 мл.

Фирмы: Фармазащита НПЦ ГП, Россия; Oranienburger Pharmawerk GmbH, Германия.

21. В защищенном от света месте.