

Средства для лечения печеночной недостаточности

АРТИШОКА ЛИСТЬЕВ ЭКСТРАКТ

1. Артишока листьев экстракт

2. Артишоков экстракт

3. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта (Средства для лечения печеночной недостаточности)

4. Усиливает секрецию желчи.

5. Уровень убедительности доказательств В. Результаты опубликованных работ подтверждают эффективность препарата у больных хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы, включая гепатиты и циррозы печени различной этиологии, а также при заболеваниях, сопровождающихся дислипотеидемией. При хронической почечной недостаточности умеренно снижает концентрацию креатинина и мочевины в крови. Препарат существенно снижает тяжесть и предупреждает развитие гестозов беременных.

6. Нет данных.

7. Экстракт артишока полевого является выраженным гепатопротектором, цитопротектором и антиоксидантом, усиливает секрецию желчи, нормализует липидный обмен. Препарат улучшает почечную фильтрацию и положительно действует на белковый обмен, что приводит к уменьшению азотемии. Способствует выведению из организма токсинов, в том числе нитросоединений, алкалоидов, солей тяжелых металлов. В связи с тем что действие препарата является совокупным всех его компонентов, проведение фармакокинетических исследований, а так же биоэквивалентности для аналогов не представляется возможным.

8. Алкогольные и неалкогольные стеатозы и стеатогепатиты, острые и хронические гепатиты различной этиологии, циррозы печени, острые и хронические интоксикации гепатотоксическими веществами, дискинезии желчевыводящих путей, хроническая почечная недостаточность, хронические нефриты, нарушения липидного обмена, профилактика и лечение гестозов беременных.

9. Желчнокаменная болезнь, обструкция билиарных протоков, индивидуальная непереносимость.

10. Субъективная оценка больного о результатах лечения (уменьшается метеоризм, тяжесть в правом подреберье, улучшается сон, аппетит, нормализуется стул).

Лабораторные: динамика содержания билирубина, аминотрансфераз, альбуминов, креатинина, мочевины, улучшение показателей липидного обмена, а так же состава желчи. Инструментальные: динамика дискинезий билиарного тракта и двенадцатиперстной кишки.

11. Взрослым препарат назначается внутрь по 400-600 мг или по 2,5-5,0 мл раствора 3 раза в сутки до еды, средняя продолжительность лечения 2-3 недели. Может назначаться в/в или в/м по 5-10 мл в сутки в течение 10-15 дней.

Детям в зависимости от возраста назначают по 1-2 таб. 3 раза в день перед едой. Доза препарата в растворе и в инъекциях составляет 1/4 - 1/2 дозы, применяемой у взрослых.

12. Возможно появление диареи.

13. Препарат не следует назначать у больных с диареей.

14. Препарат может быть использован в период беременности. При выраженной печеночной недостаточности применение препарата нецелесообразно.

15. При длительном приеме в высоких дозах возможно развитие диареи.

16. Не выявлено.

17. Не применяется.

18. Раствор для приема внутрь разводить водой. При появлении признаков аллергической реакции (сыпь, кожный зуд, отеки и др.), диареи прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

19. Пациент должен дать согласие на лечение возможных осложнений.

20. Драже 300 мг.

Фирмы: Hexal, Германия.

21. Список Б. При комнатной температуре.