

Противовоспалительные средства

АЗАПЕНТАЦЕН

1. Азапентацен.
2. Квинакс.
3. Средства для лечения офтальмологических заболеваний, не обозначенных в других рубриках (Противовоспалительные средства).
4. Противокатарактальное средство.
5. Уровень убедительности доказательств С.
6. Нет данных.
7. Предохраняет сульфгидрильные группы хрусталика от окисления и способствует рассасыванию непрозрачных белков хрусталика. Обладает активирующим влиянием на протеолитические ферменты, содержащиеся в водянистой влаге передней камеры глаза. Снятие чувства тревоги позволяет пациенту также повысить надежду на улучшение общего состояния.
8. Катаракта (старческая, травматическая, врожденная, вторичная).
9. Повышенная чувствительность к компонентам глазных капель.
10. Задержка снижения остроты зрения, реже – повышение остроты зрения.
11. Инстилляцией по 1-2 капли 3 раза, а при более выраженных формах – 5 раз в день, длительно, в течение месяцев, если не возникает раздражение слизистой как результат токсического или аллергизирующего действия. Отменяют при появлении раздражающего действия капель.
12. Может быть связана с высокой индивидуальной чувствительностью.
13. Нет данных.
14. Препарат предназначен для лечения больных в основном пожилого возраста.
15. Связаны с повышенной индивидуальной чувствительностью и проявляются токсико-аллергической реакцией конъюнктивы (гиперемией, отеком, слезотечением), в тяжелых случаях - эпителиопатия роговицы. Отменяют препарат, а при выраженной аллергической реакции – назначают противоаллергические (антигистаминные глазные капли, а при появлении системных признаков аллергии – назначают антигистаминные препараты внутрь).
16. Нет данных.
17. Не применяется.
18. Пациент информируется о необходимости постоянного приема препарата, длительно и о возможных побочных эффектах. Пациент предупреждается о возможности возникновения токсико-аллергического раздражения слизистой глаз (покраснение слизистой, отек век, слезотечение, светобоязнь) и необходимости отменить препарат и обратиться к врачу.
19. Пациент должен дать согласие на лечение возможных осложнений.
20. Раствор офтальмологический стерильный (флаконы) 5 мл, 15 мл, 35 мл.
Фирмы: Alcon-Couvreur, Швейцария.
21. В плотно закрытом флаконе при температуре от 8 до 24⁰С в защищенном от света, недоступном для детей месте.